

## 経結膜的眼窩脂肪移動術と PCL 糸を用いた中顔面リフトの併用

Combination of transconjunctival orbital fat repositioning and midface lift with PCL thread

芝 容平<sup>1)</sup>、山本 しおり<sup>1)</sup>、片岡 二郎<sup>2)</sup>

Yohei Shiba<sup>1)</sup>, Shiori Yamamoto<sup>1)</sup>, Jiro Kataoka<sup>2)</sup>

湘南美容クリニック 立川院<sup>1)</sup>、湘南美容クリニック 新宿院<sup>2)</sup>

Shonan Beauty Clinic Tachikawa<sup>1)</sup>, Shonan Beauty Clinic Shinjuku<sup>2)</sup>

### ■抄録

経結膜的眼窩脂肪移動術に PCL (ポリカプロラクトン) 糸を用いた中顔面のリフトアップを併用し良好な結果が得られている。眼窩脂肪の内下方への移動、SOOF 引き上げに加えて、PCL 糸によるメイラーファットの引き上げを行うことで、より理想的な中顔面を形成することが可能と考える。

### ■Abstract

Transconjunctival orbital fat repositioning combined with midface lift using PCL (polycaprolactone) thread has shown good results. In addition to the inferior orbital fat transfer and SOOF lifting, we believe that the PCL thread can be used to lift the Malar fat vertically to create a more ideal midface.